

По состоянию на 30.03.2020 - это пока ещё ПРОЕКТ, т.е., возможно ещё будет дорабатываться

Приложение  
к приказу Министерства  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**Изменения,  
которые вносятся в приложения № 1 и 2 к классификациям и  
критериям, используемым при осуществлении медико-социальной  
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями  
медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства  
труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 27 августа 2019 г. № 585н**

1. В приложении № 1 к классификациям и критериям:

1) абзац второй примечания к пункту 2 после слов «проводимой терапии»  
дополнить словами «в течение пяти лет»;

2) подпункты 2.1.1.1 - 2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439; В 310 - 399	Рак нижней губы I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (органосохранное оперативное вмешательство), без местных и/или общих осложнений	10 - 30
2.1.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 310 - 399	Рак нижней губы I, II стадии (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения, (оперативное вмешательство на первичном очаге и на лимфатическом коллекторе шеи, при проведении лучевой	40 - 60

						терапии в случае отказа пациента от оперативного лечения) без местных и/или общих осложнений	
2.1.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 310 - 399	Рак нижней губы I, II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после проведенного радикального лечения. Локальный рецидив или остаточная опухоль; наличие местных и/или общих осложнений.	70 - 80

»;

3) подпункты 2.1.2.1 - 2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.2.1					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 510 - 539, В 310 - 399	Рак полости рта и глотки I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (операция на первичном очаге)	10 - 30
2.1.2.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения, (операция на первичном очаге ± шейная диссекция + химиолучевая терапия или	40 - 60

						реоперация + лучевая терапия) без местных и/или общих осложнений.	
2.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539	Рак полости рта и ротоглотки (при локализации корень языка, миндалины, мягкое небо, задняя стенка глотки) II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального; с наличием местных и/или общих осложнений. При наличии неблагоприятных патологических характеристик, в особенности при локализации в области языка или дна полости рта (глубина инвазии опухоли $\geq 3-4$ мм, прорастание опухолью капсулы лимфатического узла, положительные края, множественные регионарные метастазы, периневральная/лимфатическая/сосудистая инвазия). Трахеостома	70 - 80

»;

4) подпункт 2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и	Рак пищевода I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (при выполнении	10 - 30
---------	--	--	--	--	---	---	---------

					метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 540 - 559	эндоскопической резекции в пределах слизистой оболочки или подслизистого слоя), без местных и/или общих осложнений	
--	--	--	--	--	--	--	--

»;

5) подпункт 2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак пищевода I, II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения (в том числе при комбинированном лечении) при наличии местных и/или общих осложнений. Гастростома, наличие эзофагогастрального зонда	70 - 80
---------	--	--	--	--	--	---	---------

»;

б) подпункты 2.1.4.1 - 2.1.4.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак желудка I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения (при выполнении эндоскопической резекции), без местных и/или общих осложнений	10 - 30
2.1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (при хирургическом лечении рака желудка), без местных и/или общих осложнений. Гастрэктомия	40 - 60

2.1.4.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак желудка I, II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального, комбинированного или комплексного лечения, наличие местных и/или общих осложнений и последствий лечения	70 - 80
---------	--	--	--	--	---	--	---------

»;

7) подпункт 2.1.5.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.5.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак кишечника I стадии (T1N0M0) после радикального лечения, (при органосохранных и функционально-щадящих способов лечения (эндоскопическая резекция слизистой оболочки)	10 - 30
---------	--	--	--	--	--	---	---------

»;

8) подпункт 2.1.5.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.5.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак кишечника II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного, радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Еюностома, сигмостома	70 - 80
---------	--	--	--	--	---	--	---------

»;

9) подпункт 2.1.6.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.6.1					Нарушения функций	Рак прямой кишки I,	10 - 30
---------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------

					системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (при выполнении хирургического лечения методом трансанального полнослойного эндоскопического удаления опухоли)	
--	--	--	--	--	---	--	--

»;

10) подпункт 2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.6.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак прямой кишки I, II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Сигмостома, еюностома, ректовагинальный свищ	70 - 80
---------	--	--	--	--	---	--	---------

»;

11) подпункт 2.1.7.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.7.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак печени и внутриспеченочных желчных протоков I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения (резекции печени) без местных и общих осложнений с учетом объективной оценки функциональной состоятельности остающейся части печени)	40 - 60
---------	--	--	--	--	---	---	---------

»;

12) подпункт 2.1.8.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.8.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного, радикального лечения, наличие общих и/или местных осложнений	70 - 80
---------	--	--	--	--	---	--	---------

»;

13) подпункты 2.1.10.2 - 2.1.10.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.10.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399	Рак гортани I, II стадии (T1,2,3N1M0) после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и/или лучевой терапии по радикальной программе без местных и/или общих осложнений.	40 - 60
2.1.10.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 310 - 399	Рак гортани II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения (ларингэктомия), наличие местных и/или общих осложнений. Постоянная трахеостома	70 - 80

»;

14) подпункты 2.1.11.1 - 2.1.11.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.11.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы;	Рак бронхов и легкого I стадии (Tis,1N0M0) после	10 - 30
----------	--	--	--	--	---	--	---------

					МКФ: В 430 - 439	радикального лечения (при проведении торакоскопической лобэктомии и билобэктомии), без местных и/или общих осложнений	
2.1.11.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439	Рак бронхов и легкого I, II стадии (Tis,1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений (при проведении торакоскопической лобэктомии и билобэктомии с медиастинальной лимфодиссекцией) Пульмонэктомия (при переосвидетельствовании без признаков снижения кардио-респираторных резервов)	40 - 60
2.1.11.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439	Рак легкого II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M04) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. После радикальной лучевой терапии больным I-II стадиями при функциональной неоперабельности, высоком риске хирургических осложнений и отказе пациента. При II стадии заболевания в случае невозможности хирургического лечения после	70 - 80



						<p>проведения химиолучевой терапии, или лучевой терапии, или полихимиотерапи. При проведении лечения мелкоклеточного рака легких независимо от стадии заболевания. Пульмонэктомия (при первичном освидетельствовании) и/или при снижении кардио-респираторных резервов)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

»;

15) подпункт 2.1.13.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.13.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849</p>	<p>Меланома кожи I, стадии (T1aN0M0) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений</p>	10 - 30
----------	--	--	--	--	---	---	---------

»;

16) подпункт 2.1.13.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.13.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849</p>	<p>Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. В случае невозможности выполнения хирургического иссечения первичной опухоли из-за наличия выраженных сопутствующих заболеваний</p>	70 - 80
----------	--	--	--	--	--	---	---------

						рекомендуется проведение локальной лучевой терапии. Наличие местного рецидива на фоне проводимой терапии	
--	--	--	--	--	--	---	--

»;

17) подпункт 2.1.14.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.14.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849	Меланома глаза T1,2N0M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения при повторном освидетельствовании, без местных и/или общих осложнений	40 - 60
----------	--	--	--	--	---	--	---------

»;

18) подпункты 2.1.15.1 - 2.1.15.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.15.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849	Рак кожи I стадии (T1N0M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений	10 - 30
2.1.15.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 810 - 849	Рак кожи II стадии (T2,3N0,1M0) после радикального лечения (хирургическое ± лучевая терапия, при лимфодиссекции соответствующего лимфатического коллектора) без местных и/или общих осложнений	40 - 60

»;

19) подпункты 2.1.17.1 - 2.1.17.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.17.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак молочной железы I стадии (Tis, 1N0M0) после радикального лечения (органосохраняющее хирургическое вмешательство (секторальная резекция) без местных и/или общих осложнений	10 - 30
2.1.17.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак молочной железы I, II стадии (T1N0M0) после двусторонней мастэктомии.  Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения (мастэктомия) без местных и/или общих осложнений. При наличии противопоказаний к проведению показанных методов лечения	40 - 60
2.1.17.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения (мастэктомия), двусторонней мастэктомии при наличии общих противопоказаний к проведению показанных методов лечения.  Рак молочной железы I, II, III стадии (T1,2,3N0,1M0) после двусторонней мастэктомии.	70 - 80

						Рак молочной железы II, III стадии (T2,3,4 N0,1M0) после радикального лечения, (мастэктомия), наличие местных и/или общих осложнений. Проведение адъювантной полихимиотерапии в дополнение к хирургическому и лечению, лучевой терапии	
--	--	--	--	--	--	--	--

»;

20) подпункты 2.1.18.1 - 2.1.18.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.18.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: В 430 - 439	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения (при органосохранных и функционально-щадящих способах лечения)	10 - 30
2.1.18.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального хирургического лечения ± сочетанной лучевой терапии ± внутрисполостной лучевой терапии, без местных и/или общих осложнений	40 - 60

»;

21) подпункты 2.1.19.1 - 2.1.19.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.19.1					Нарушение функции	Рак шейки или тела	10 - 30
----------	--	--	--	--	-------------------	--------------------	---------

					системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	матки I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения, при органосохранных и функционально-щадящих способах лечения (конизация шейки матки с последующим выскабливанием оставшейся части цервикального канала, полости матки)	
2.1.19.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2aN0,1M0) после радикального лечения (выполнение модифицированной расширенной экстирпации матки, лучевой терапии/полихимиотерапии по радикальной программе) без местных и/или общих осложнений	40 - 60
2.1.19.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак шейки или тела матки II, III стадии (T1,2a,b,N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений (урогенитальный, ректовагинальный свищи)	70 - 80

22) подпункт 2.1.20.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.20.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак яичника II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения. Низкодифференцированная опухоль, рецидив, необходимость повторных операций. Наличие местных и/или общих осложнений	70 - 80
----------	--	--	--	--	--	--	---------

»;

23) подпункты 2.1.22.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.22.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 540 - 559	Рак предстательной железы I - II стадии (T1,2N0,1M0) при динамическом наблюдении с гормональным лечением; после радикального лечения без местных и/или общих осложнений	40 - 60
----------	--	--	--	--	---	---	---------

»;

24) подпункт 2.1.23.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.23.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: В 430 - 439	Рак яичка I стадии (T1N0M0, SO, SX) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений	10 - 30
----------	--	--	--	--	--	--	---------

»;

25) подпункты 2.1.24.1 - 2.1.24.4 изложить в следующей редакции:

«

2.1.24.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак почки (T1N0M0) Рак почечной лоханки (T1N0M0) после радикального лечения, при органосохранных и функционально-щадящих способов лечения (после лапароскопического лечения) без нарушения функции второй почки.	10 - 30
2.1.24.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439; В 610 - 639	Рак почки (T1-4N0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N0M0) после радикального лечения, при нарушении функции контрлатеральной («здоровой») почки; без местных и/или общих осложнений	40 - 60
2.1.24.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 610 - 639	Рак почки (T1-4N0-1M0) и рак почечной лоханки (T3-4N0-1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений; функционирующая контрлатеральная почка, пораженная процессом, который может привести к ухудшению ее функции в будущем, при умеренно выраженных нарушениях функции второй почки	70 - 80
2.1.24.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с	Рак почки и почечной лоханки (T1-4N0-1M1). Рак почечной лоханки (T3-4N0-	90 - 100

					движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 710 - 789	3M1), инкурабельное состояние. Нефростома	
--	--	--	--	--	--	--	--

»;

26) подпункты 2.1.25.1 - 2.1.25.4 изложить в следующей редакции:

«

2.1.25.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак мочевого пузыря I стадии (T1N0M0) после радикального удаления опухоли. Трансуретральная резекция мочевого пузыря и ранней однократной инстилляции химиопрепарата	10 - 30
2.1.25.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639	Рак мочевого пузыря I - II стадии (T1,2a,bN0,1M0) после радикальной резекции мочевого пузыря, без местных и/или общих осложнений	40 - 60
2.1.25.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	Рак мочевого пузыря I - IV стадия (T1,2,3,4N2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Внутрипузырная полихимиотерапия	70 - 80



						продолжительностью в течение 1 года или адъювантная внутривузырная иммунотерапия вакциной БЦЖ (в полной дозе) с поддерживающей терапией 1 год. При первичном освидетельствовании устранимая цистостома и уретерокутанеостома	
2.1.25.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639, В 710 - 789	Рак мочевого пузыря IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние. Рак мочевого пузыря после паллиативного лечения. Цистэктомия. Неустранимая цистостома. Неустранимая уретерокутанеостома	90 - 100

»;

27) подпункты 2.1.22.1 - 2.1.27.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.27.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак щитовидной железы (T1N0M0) (высокодифференцированный рак), после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений	10 - 30
----------	--	--	--	--	---	---	---------

2.1.27.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310 - 399, В 430 - 439, В 540 - 559	Рак щитовидной железы (Т1,2N0M0) после радикального лечения (гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка, субтотальная резекция щитовидной железы или тиреоидэктомия ± удаление центральной клетчатки на стороне опухоли) без местных и/или общих осложнений	40 - 60
----------	--	--	--	--	--	---	---------

»;

28) дополнить подпунктами 2.1.30.8, 2.1.30.8.1 - 2.1.30.8.3 следующего содержания:

«

2.1.30.8			Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций	С97			
2.1.30.8.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и		

					речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 310 - 399, В 201 - 229, В 230 - 249, В 199		
2.1.30.8.2						Синхронный (возникший одновременно) и метахромный (возникший последовательно через 6 месяцев после радикального лечения первичной опухоли) рак после радикального лечения	70 - 80
2.1.30.8.3						Синхронный и метахромный рак прогрессирующее основного заболевания	90 - 100

».

2. Пункт 2 приложения № 2 к классификациям и критериям дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания:

«

2.1.7		Злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата	Ретинобластома	С69, С69.2	Нарушения психических функций, функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), кожи и связанных с ней систем: МКФ: В 110-199, В 430-439, В 210-229 (зрения), В 810-849	Для детей в возрасте 0-17 лет: после проведения операции по удалению глазного яблока в зависимости от имеющихся нарушений функций организма	40-100
-------	--	---	----------------	------------	---	--	--------

».