www.invalidnost.com

Актуальные вопросы проведения медико-социальной экспертизы при туберкулезе

Количественная оценка степени нарушения функций организма граждан старше 18 лет и для детей в возрасте 0-17 лет в Приложении к приказу Минтруда России № 585н, представлена под номерами 1.1. – 1.3.4 для взрослых и 1.1 по 1.4.1.3 для детей.

- Согласно статистике туберкулез у взрослых встречается значительно чаще, чем туберкулез детского населения, рассмотрим особенности использования количественной оценки степени нарушений функций организма у граждан старше 18 лет в Приложении приказа № 585н.

Представленная количественная оценка значительно более полная, в большей степени основанная на клинических проявления заболевания, что особенно важно при формировании экспертного решения при туберкулезе, когда ведущими являются эпидемиологический статус освидетельствуемого (МБТ+, МБТ-), рентгенологическая стадия, фаза процесса, определяющие степень выраженности нарушенных функций организма, ограничение жизнедеятельности и потребности в мерах реабилитации.

Приложением предусмотрены клино-функциональные характеристики стойких нарушений функций организма гражданин, больных туберкулезом, имеющие место в современных условиях при наличии большого выбора препаратов специфического действия и широкой распространенности резистентности к ним, туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, а также использования при исследовании компьютерной томографии, современных бактериологических, молекулярно-генетических методов исследования биоматериала.

Количественная оценка при туберкулезе различной локализации зависит от:

клинической формы заболевания;

рентгенологической стадии;

периода и фазы процесса;

наличия (отсутствия) бактериовыделения;

течения заболевания (наличие или отсутствие осложнений);

характера и вида осложнений, в том числе в результате проводимой химиотерапии;

от эффективности проводимого лечения.

1; Класс болезней (по МКБ-10): Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс 1)

1.1 Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15

Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически; A16

По Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья виды стойких расстройств функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы.

1.1.1 - 10 – 30%; Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных изменений.

Отсутствие ДН или наличие ДН 1 степени.

1.1.2 - 40 – 60%; Умеренные нарушения функции дыхательной системы

при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии;

при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности;

и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).

Наличие МБТ+ 6 и более месяцев(?).

1.1.3 – 70 – 80%; Выраженные нарушения функции дыхательной системы

при неэффективности химиотерапии;

при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности;

и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы).

Наличие ДН II, III степени и ХСН IIA стадии.

1.1.4 по МКФ нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы.

90 – 100%; Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных осложнений (амилоидоз, декомпенсированное хроническое легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее).
Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии

1.2 Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Туберкулез нервной системы A17
Туберкулез других органов A18
Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез A19

по МКФ нарушения психических, языковых, сенсорных, статодинамических функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем (в зависимости от пораженных туберкулезом органов и систем).

1.2.1 – 10–30%; Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения.

Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН 1 степени.

1.2.2 – 40-60%; Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).

1.2.3 – 70-80%; Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II, III степени, ХСН IIA стадии.

1.2.4 – 90-100%; Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее);

Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии.

Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Последствия туберкулеза; B90.

По МКФ нарушения психических, языковых, сенсорных, статодинамических функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем.

1.3.1 - 10-30%; Незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза.

При отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН 1 степени.

1.3.2. – 40-60%; Умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)

1.3.3 – 70-80%; Выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН II III степени, ХСН IIA стадии.

1.3.4 – 90–100%; Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН III степени, ХСН ПБ или III стадии.

Актуальные вопросы проведения медико-социальной экспертизы при туберкулезе детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от:

клинической формы заболевания;

рентгенологической стадии;

периода и фазы процесса;

наличия (отсутствия) бактериовыделения;

течения заболевания (наличие или отсутствие осложнений);

характера и вида осложнений, в том числе в результате проводимой химиотерапии;

от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему.

Пункт 1.4; Блок болезней: Осложнения после введения вакцины БЦЖ;

Пункт 1.4.1 Наименование болезней: Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит);

Рубрика МКБ10: Y58

По МКФ нарушение статодинамических функций, функций системы крови и иммунной системы.

1.4.1.1 – 10-30%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии незначительных нарушений функций организма

1.4.1.2 – 40-60%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии умеренных нарушений функций организма;

0 - 7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами.

1.1.4.1.3; 70-80%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии выраженных нарушений функций организма.