

Место приема : ДЦ 5 Ф 1 (ГП 43)

Врач : Алексеева О. А.

Дата : 25.05.2022

Полис ОМС : 7752030834000426

Осмотр пульмонолога

Жалобы	предъявляет. На одышку при нагрузке, местами в покое, влажный кашель в теч. сухок, больше в дневное время, приступами, свистящее дыхание. .
Анамнез заболевания	13.05.22. Со слов пац. в детстве Бр. астма. С 20 лет ремиссия. Документов о наличии бр. астмы нет. Курит 40 лет ,ранее 10 сиг/ сутки , в наст .вр. 1 сиг / сутки. Последние 10 лет свистящее дыхание , кашель. Курить не бросил. Стац. леч. в 15.03.22. Синдром Пиквика: Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией. Гипертоническая болезнь III степени, риск ССО 4. ХСН IIБ ст III ф.к. ДН 1 ст. Бронхиальная астма, смешанная, неконтролируемое течение, обострение. ХОБЛ , средне-тяжелое течение, обострение.КТ огк от 25.10.22. Заключение: Легкие без очаговых и инфильтративных изменений. Эмфизема. Косвенные признаки легочной гипертензии. Аллергоан .цветение- до 18 лет. НАсл. б/о. ФВД из стац. FVC 2.79 61 FEV1.0 1.27 35 FEV1.0/FVC 45 58 Жизненная емкость легких значительно снижена. Зафиксировано значительное нарушение проходимости дыхательных путей.25.05.22. ОФВ1 =- 42. Проба положит, ИП 52. ИТ 79. .
Общий осмотр	Общее состояние: состояние относит. удовлетворительное . В легких жесткое дыхание, сухие хрипы. ЧДД 16 в мин. Сатурация O2 = 97 %. ЧСС 78 в мин..
Основной диагноз	J45.8 - Смешанная астма. Подтвержден. БА смешанная ср. тяжести , частично контролируемая ..
Дополнительный диагноз	J44.8 - Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь. ХОБЛ т/т . Эмфизема. Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией. Гипертоническая болезнь III степени, риск ССО 4. ХСН IIБ ст III ф.к. ДН 1 -2 ст. ..
Рекомендации	Режим: амбулаторный, рекомендации по питанию: лечение :1..... Формотерол / будесонид 4.5 /160 4 инг/ сутки (Симбикорт ,Формисонид ,Дуоресп) или 12/400(Форадил комби) - 2 р. / сутки или Салметерол / флутиказон 50/250 (Салтиказон) 1 капсула 2 р/сутки или 25/250 (Серетид ,Сальмекорт , Респисальф) 2 ингаляции 2 р/ сутки или Формотерол / беклометазон 6/100 (Фостер) 2 ингаляции 2 р/сутки Далее до и после гормонального ингалятора полоскать горло простой водой . /..... 2. Сальбутамол (Ипратропий / фенотерол - Беродуал , Ипратерол) 1 ИНГАЛЯЦИЯ ПРИ УДУШЬЕ , НЕ БОЛЕЕ 4 ИНГ/ СУТКИ. 1 уп. в 3-4 мес. /..... 3. Ипратропий/ фенотерол (Беродуал ,Ипратерол,Астмасол) 2 уп. в мес. Через небулайзер. 2 нед. при обострении БА. /..... Повт визит через 3 мес . Без ФВД. Для контроля терапии. С Собой тетрадь,ингаляторы,заключение пульмонолога,спирометрию..