

С. В. Трекин, Н. В. Трекина

СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПАРЕЗАХ И ПЛЕГИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области", Самара

Представлен обобщенный опыт неврологической практики по разработке стандартов соответствия степени нарушения функций конечностей при парезах и плегиях и степени нарушения статодинамических функций, что может быть использовано в практической деятельности неврологов как службы медико-социальной экспертизы, так и лечебно-профилактических учреждений.

Ключевые слова: *парезы конечностей, плегии конечностей, степень выраженности нарушений статодинамических функций*

DEGREES OF ABNORMALITIES OF STATIC AND DYNAMIC FUNCTIONS OF ORGANISM AT PARESSES AND PLEGIA OF EXTREMITIES

S.V.Trekin, N.V.Trekina

In the article there have been presented the experience of neurological practice in the development of standards compliance degree of abnormalities of the extremities in a case of paresis and plegia with the degree of disorders of static-dynamic functions that can be used in the practice of neurologists at the service of medical and social expertise and also at health care institutions.

Key words: *paresises and plegia of extremities, severity of static-dynamic functions disorders.*

В практической деятельности каждый врач-специалист по медико-социальной экспертизе, в том числе и невролог, руководствуется классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1013н [1], которые выделяют 4 степени выраженности основных видов нарушений функций орга-

низма: I степень – незначительные нарушения; II степень – умеренные нарушения; III степень – выраженные нарушения; IV степень – значительно выраженные нарушения.

Исходя из более чем 20-летнего неврологического опыта работы в учреждениях медико-социальной экспертизы, авторы предлагают для единой оценки соответствия степени выраженности парезов и плегий конечностей и степени нарушения статодинамических функций, к которым приводят поражения нервной системы с очаговой органической симптоматикой, ис-

Таблица 1

Нарушения статодинамических функций при верхних моно- и парапарезах

отсутствие нарушений	Выраженность нарушений статодинамических функций			
	незначительные (I степень)	умеренные (II степень)	выраженные (III степень)	значительно выраженные (IV степень)
Легкий дистальный верхний монопарез	Умеренный дистальный верхний монопарез	Выраженный дистальный верхний монопарез	Выраженный дистальный верхний парапарез	Значительно выраженный дистальный верхний парапарез
Легкий проксимальный верхний монопарез	Умеренный проксимальный верхний монопарез	Значительно выраженный дистальный верхний монопарез	Значительно выраженный проксимальный верхний парапарез	Дистальная верхняя параплегия
Легкий верхний монопарез	Умеренный верхний монопарез	Дистальная верхняя моноплегия	Проксимальная верхняя параплегия	Значительно выраженный верхний парапарез
Легкий проксимальный верхний парапарез	Легкий дистальный верхний парапарез	Значительно выраженный проксимальный верхний монопарез	Выраженный верхний парапарез	Верхняя параплегия
—	Умеренный проксимальный верхний парапарез	Проксимальная верхняя моноплегия	—	—
—	Легкий верхний парапарез	Выраженный верхний монопарез	—	—
—	—	Значительно выраженный верхний монопарез	—	—
—	—	Верхняя моноплегия	—	—
—	—	Умеренный дистальный верхний парапарез	—	—
—	—	Выраженный проксимальный верхний парапарез	—	—
—	—	Умеренный верхний парапарез	—	—

Таблица 2

Нарушение статодинамических функций при нижних моно- и парапарезах

отсутствие нарушений	Выраженность нарушений статодинамических функций			
	незначительные (I степень)	умеренные (II степень)	выраженные (III степень)	значительно выраженные (IV степень)
Легкий дистальный нижний монопарез	Выраженный дистальный нижний монопарез	Выраженный проксимальный нижний монопарез	Значительно выраженный дистальный нижний парапарез	Значительно выраженный проксимальный нижний парапарез
Умеренный дистальный нижний монопарез	Значительно выраженный дистальный нижний монопарез	Значительно выраженный проксимальный нижний монопарез	Дистальная нижняя параплегия	Проксимальная нижняя параплегия
Легкий проксимальный нижний монопарез	Дистальная нижняя моноплегия	Проксимальная нижняя моноплегия	Выраженный проксимальный нижний парапарез	Значительно выраженный нижний парапарез
Легкий нижний монопарез	Умеренный проксимальный нижний монопарез	Выраженный нижний монопарез	Выраженный нижний парапарез	Нижняя параплегия
Легкий дистальный нижний парапарез	Умеренный нижний монопарез	Значительно выраженный нижний монопарез	—	—
—	Умеренный дистальный нижний парапарез	Нижняя моноплегия	—	—
—	Легкий проксимальный нижний парапарез	Выраженный дистальный нижний парапарез	—	—
—	Легкий нижний парапарез	Умеренный проксимальный нижний парапарез	—	—
—	—	Умеренный нижний парапарез	—	—

Таблица 3

Нарушение статодинамических функций при гемипарезах

незначительные (I степень)	Выраженность нарушений статодинамических функций			
	умеренные (II степень)	выраженные (III степень)	значительно выраженные (IV степень)	
Легкий гемипарез	Умеренный гемипарез	Выраженный гемипарез	—	Значительно выраженный гемипарез Гемиплегия

Таблица 4

Нарушение статодинамических функций при трипарезах

Выраженность нарушений статодинамических функций			
незначительные (I степень)	умеренные (II степень)	выраженные (III степень)	значительно выраженные (IV степень)
Легкий гемипарез, легкий монопарез	Легкий гемипарез в сочетании с умеренным, выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией	Умеренный гемипарез в сочетании с умеренным, выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией	Выраженный гемипарез в сочетании с выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией
—	Умеренный гемипарез, легкий монопарез	Выраженный гемипарез, легкий монопарез	Значительно выраженный гемипарез в сочетании с легким, умеренным, выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией
—	—	Выраженный гемипарез, умеренный монопарез	Гемиплегия в сочетании с легким, умеренным, выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией
—	—	—	Гемиплегия в сочетании с умеренным, выраженным, значительно выраженным монопарезом или моноплегией

Таблица 5

Нарушение статодинамических функций при тетрапарезах

Выраженность нарушений статодинамических функций			
незначительные (I степень)	умеренные (II степень)	выраженные (III степень)	значительно вы- раженные (IV степень)
—	Легкий тетрапарез	Умеренный тетрапарез	Выраженный тетрапарез
—	—	—	Значительно выраженный тетрапарез
—	—	—	Тетраплегия

пользовать в практике медико-социальной экспертизы следующие примерные стандарты, представленные в виде таблиц (табл. 1–5).

С применением представленных выше данных, на наш взгляд, будет соблюдена преемственность в работе врачей-неврологов, что позволит снизить количество экспертных ошибок и избежать возможные конфликтные ситуации, возникающие при частичной или полной реабилитации инвалидов в случае

разного подхода врачей-неврологов к одинаковой степени выраженности неврологической симптоматике.

ЛИТЕРАТУРА

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1013н "Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 6. – Ст. 765.

Поступила 29.09.10

Сведения об авторах:

Трекин С. В., врач-невролог, руководитель филиала № 7 ФГУ "Главное бюро медико-соц. экспертизы по Самарской области"; Трекина Н. В., врач-невролог, специалист по медико-соц. экспертизе филиала № 21 ФГУ "Главное бюро медико-соц. экспертизы по Самарской области"

Для контактов:

Трекин Сергей Викторович, 443098, Самара, просп. Карла Маркса, д. 455. Телефон: 8(846) 996-02-35